

McGivney behandling

Langt de fleste hæmorider kan behandles med elastikker også kaldet ligaturer.

Behandlingen tager få minutter.

Ligaturerne påsættes slimhinden i endetarmen, 3-4 cm fra lukkemusklen.

Gennem et 10 cm langt rør (anoskop) sættes en lille sugekop på slimhinden. Slimhinde i en mængde svarende til en ært, suges ind i sugekoppen. En lille elastik skydes ned over slimhinden som på denne måde berøves sin blodforsyning, visner og falder af sammen med elastikken efter 5 – 14 dage.

Der kan opstå en lille blødning i forbindelse hermed.

Ved behandlingen produceres et ar der som en punktsvejsning lodder slimhinden til tarmens muskulatur.

Der sættes 1 eller 2 ligaturer pr. behandling.

Behandlingen er sjældent smertefuld. De fleste beskriver fornemmelsen som "afførings trykken".

Behandlingen skal ofte gentages efter nogle år.

Forberedelse

Ligaturer kan ikke placeres i en afføringsfyldt tarm.

Endetarmen er normalt tom.

Er den ikke det må der en udtømning til i form af et Mikrolax som tages 2 timer før behandlingen. Mikrolax udrensner den nederste del af endetarm og tyktarm.

Mikrolax udleveres på klinikken.